

# 1

## Recommandations



**URGENT**

-Si possible avant l'instauration du traitement anti-infectieux

- En cas de prises d'anti-infectieux: laisser une fenêtre sans antibiotiques.

- 1 mois : vibramycine et la rifampicine,
- 3 semaines : fluoroquinolones, macrolides aminosides
- 15 jours : autres antibiotiques

- Pas d'antibioprophylaxie pré ou per-opératoire

# 2

## Renseignements



-Date/Heure

-Anti-Infectieux

-Pathologies associées :  
néoplasies, maladies auto-immunes, ...  
-Préciser les **recherches spécifiques**:  
BK, Mycobactéries, Actinomyces, Nocardia

# 3

## Hygiène Préleveur



- Lavage des mains
- Friction Hydroalcoolique
- Port de gant

# 4

## Hygiène Patient



- Désinfection en 4 temps
- Selon le protocole de l'établissement

# 5

## Prélèvement

Prélever entre 3 et 5 sites anatomiques différents, solides et liquides, multi-sites et étagés.  
Les prélèvements d'interface ou au contact du matériel sont à privilégier.



Ecouvillon



Liquide



Solide



Eswab



Eswab



Flacon Bille

# 6

## Identification

ETIQUETTE PATIENT	
Nom :	_____
Nom jeune fille :	_____
Prénom :	_____
Né(e) le :	__/__/__ Sexe <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F

# 7

## Transmission

< 2H



**URGENT**

