

1

Recommandations



- Si possible avant l'instauration du traitement anti-infectieux
- Conseil Arrêt Anti-Infectieux :
Voie Orale : 7 jours / Voie Locale : 3 jours / Chlamydia : 5 semaines
- Ne pas uriner pendant les 2 heures avant le prélèvement
- Ne pas faire de toilette ou de traitement local
- Ne pas réaliser pendant la période menstruelle

2

Renseignements



- Date/Heure
- Anti-Infectieux**
- Pathologies associées** : immunodépression
- Signes cliniques**: Ecoulement, IST, Fièvre
- Préciser les **recherches spécifiques**:
Mycoplasmes, ...

3

Hygiène



- Lavage des mains
- Friction Hydroalcoolique
- Port de gant

4

Prélèvement

- Installer le (la) patient(e)
- Si **présence** d'un écoulement urétral, le prélever à l'aide de l'écouvillon Eswab orange
- En l'**absence** d'écoulement urétral : Humidifier un écouvillon Eswab orange avec de l'eau physiologique. Insérer l'écouvillon dans l'urètre sur une longueur de 2 à 3 cm. Faire tourner l'écouvillon 2 à 3 fois sur lui même de manière à bien recueillir des cellules. Ressortir l'écouvillon délicatement.
- Ouvrir le tube, déposer l'écouvillon, le casser au niveau du point de rupture (ligne colorée), revisser le bouchon pour fermer le tube et agiter.



5

Identification

ETIQUETTE PATIENT	
Nom :	-----
Nom jeune fille :	-----
Prénom :	-----
Né(e) le : ___/___/___	Sexe <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F

6

Transmission

